

# **Carcinoma ovarico**

**Due trattamenti a confronto**

# **M.Camilla - M.Lorenza**

- Sorelle
- Anamnesi positiva per carcinoma ovarico (zia)
- Ambedue affette da carcinoma ovarico

# M. Camilla

- Aprile 1996 : Isteroannessiectomia  
6 cicli di CT  
(cisplatino-ciclofosfamide)
- Gennaio 1997 : MTS epatica biopsiata  
5 cicli di topotecan
- Settembre 1998 : Progressione epatica e recidiva  
pelvica inizio PDB

# PDB classico dal settembre del 1998 ad aprile 2003

Periodo di graduale remissione:

CA125 a 7.3 (da 56)

Esami strumentali (tac ed eco)  
scomparsa mts epatica, non visibilità  
recidiva pelvica

Periodo della lenta progressione:

Dal luglio 2001 al decesso giugno  
2003

- Medico di famiglia  
(Monteu)
- Ospedale Sant'Anna  
(Torino)
- Ginecologo Jura  
(Biella)



# M. Lorenza

- Aprile 1999 isteroannessiectomia
- CT : taxolo + carboplatino 6 cicli terminati nel settembre 1999
- Gennaio 2001 progressione e comparsa di ascite
- Nuovo ciclo chemioterapico (non specificato)
- Ulteriore progressione, ricovero, decesso nell'agosto 2001

# Raffronto

## Primo caso:

- Tempo di sopravvivenza dalla diagnosi al decesso: 7 anni e due mesi.
- Qualità della vita buona, compatibile con l'attività lavorativa.

## Secondo caso:

- Tempo di sopravvivenza dalla diagnosi al decesso: 2 anni e 5 mesi.
- Qualità della vita scadente, con ricoveri dovuti alla tossicità farmacologica.