

AGGIORNAMENTO STATISTICO SUI RISULTATI CLINICI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEL MDB SUI PAZIENTI (n.195) AFFETTI DA CARCINOMA MAMMARIO E RIVOLTISI ALLO STUDIO MEDICO DELLA FONDAZIONE DI BELLA nel periodo gen/2004-giu/2013.

Totale pazienti giunti in osservazione: n. 592

Hanno deciso di intraprendere il percorso terapeutico (MDB) : n. 195

L'analisi statistica è stata elaborata esaminando, pertanto, il secondo gruppo di pazienti (**195**).

Legenda:

Remissione = Scomparsa della malattia o sostanziale e progressiva riduzione (oltre il 50%) della massa


Stabilità = blocco della progressione con situazione diagnostica sostanzialmente invariata

Progressione = Peggioramento delle condizioni cliniche – progressione dell'evoluzione tumorale


PREMESSA

Situazione di Partenza e risultati generali


Le condizioni dei pazienti al momento di avvio del trial terapeutico, calcolate sul totale dei casi (195) presentano un leggero squilibrio a favore degli stadi più avanzati (**49%** stadi I / II contro **51%** stadi III / IV, ma, in particolare, circa il **40%** allo stato di avanzamento metastatico).



Nonostante ciò, e come nella precedente rilevazione statistica, vengono sostanzialmente confermati i risultati terapeutici del primo periodo osservazionale (2004-2010) :



nel 2010:



Risultati ottenuti in base alla Stadiazione


Entrando più nel dettaglio, e volendo analizzare i risultati ottenuti su gruppi omogenei di pazienti (singoli Stadi) è possibile osservare la pressoché **assoluta prevalenza di remissioni** dalla malattia negli stadi I e II e la tendenza all'inversione dell'andamento per lo Stadio III per concludersi in una netta prevalenza di casi di progressione nello Stadio IV (pur in presenza anche in questo di casi di remissioni) .

Note:


il grafico relativo allo "Stadio I" mostra una percentuale (3%) di progressioni che in realtà è determinato da un singolo caso (il gruppo è composto da un totale di 36 pazienti).

La paziente in questione (n. cartella 831) ha seguito in maniera completa la cura solo per 1 anno, passando poi, per propria scelta, alla sola cura di mantenimento con retinoidi e melatonina, vanificando così i risultati raggiunti ed esponendosi ad una ripresa della malattia.


Stadio 1




Stadio 2



Stadio 3



Stadio 4




Negli ultimi anni, in seguito ad un sensibile miglioramento dell'attività documentale ed informativa della Fondazione (grazie al Sito www.metododibella.org, e ad un certo interesse anche da parte della comunità scientifica mondiale) stiamo assistendo, in alcuni pazienti, ad un graduale e sensibile miglioramento nel processo di acquisizione delle informazioni e in "consapevolezza", tanto che cominciano a giungere persone che richiedono di poter adottare le prescrizioni terapeutiche quali "primo presidio" (rifiutando quindi anche l'eventuale intervento chirurgico che gli viene proposto dalla struttura ospedaliera).

L'analisi dei dati relativi a tale gruppo di pazienti (GRUPPO A), scomposta a seconda degli Stadi d'avanzamento della malattia, non fa altro che ribadire e ulteriormente sottolineare la potenzialità **del MDB nel proporsi quale "trattamento di prima linea"** nel trattamento terapeutico delle neoplasie mammarie.


MDB di "prima linea" - risultati

Tumori allo stadio iniziale (24 pazienti)




Note: le 4 pazienti in progressione avevano tutte ottenuto, inizialmente, una remissione della malattia. Tre di esse hanno interrotto la cura e avuto poi la ricaduta.

Tumori in fase avanzata (10 pazienti)



Un'ulteriore opzione terapeutica è data dall'utilizzo del **MDB come terapia adiuvante** (dopo asportazione chirurgica e senza precedenti o successivi trattamenti chemioterapici.

Adjuvant Therapy in Early Stage (I- II-IIIa)




Result on Patients (64)

■ remission (55)	86%
■ stability (2)	3%
■ progression (7)	11%

tumori allo **Stadio iniziale** (64 casi)

Adjuvant Therapy in Metastatic cancer(III b/c- IV)



Result on Patients (22)

■ remission (9)	41%
■ stability (3)	14%
■ progression (10)	45%

Tumori allo **Stadio avanzato** (22 casi)

SOPRAVVIVENZA (osservata) ALLA DATA DELLA DIAGNOSI

totale pazienti valutabili = 193 in quanto 2 senza documentazione completa alla diagnosi

Sopravvivenza osservata (obs) pazienti in cura MDB			
	1 anno (193)	3 anni (161)	5 anni (124)
Diagnosi			
stadio I (52)	100%	98%	94%
stadio II (87)	100%	100%	95%
stadio III (38)	100%	90%	67%
stadio IV (16)	100%	85%	70%
MDB totale (obs)	100%	93%	82%
registro ITA (obs)	95%	85%	77%

Ulteriori analisi da effettuare:

- rapporto percentuale remissioni complete/remissioni parziali e analisi
- verifiche sui casi (stadio I e II) con decorso sfavorevole (verificare cause)
- TRIPLO NEGATIVO (esaminare andamento)
- mediane di sopravvivenza IV stadio
- analisi sui tumori allo stadio avanzato (rapporto sedi metastatiche/prognosi nei casi favorevoli/sfavorevoli)